



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# イ ス ク ラ ほ ちゅう がん イスクラ補中丸<sub>T</sub>

第2類医薬品

(生薬製剤)

## ■特徴

「イスクラ補中丸<sub>T</sub>」は、オウギ、トウジン、トウキなど8種類の植物性生薬から構成され、これらの生薬を粉末にし丸剤としたもので、虚弱体質、貧血症、夏やせ、胃弱、病中・病後の体力回復、痔疾、脱肛、胃腸機能が減退し、疲労倦怠感のあるもの又は頭痛、悪寒、発汗を伴うものの改善を目的としております。

## ⚠ 使用上の注意



### ■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効能・効果

虚弱体質、貧血症、夏やせ、胃弱、病中・病後の体力回復、痔疾、脱肛、胃腸機能が減退し、疲労倦怠感のあるもの又は頭痛、悪寒、発汗を伴うもの。

※裏面もお読みください。

## ■用法・用量

成人（15歳以上）1回10丸、1日3回、食間に温水にて服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15歳以上）	10丸	3回
15歳未満	服用しないでください。	

### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児には服用させないでください。

## ■成分・分量

本品1日量30丸（4.8g）中、下記成分及び分量を含有します。

オウギ	1.14g	ビャクジュツ	0.45g
カンゾウ	0.75g	サイコ	0.09g
チンピ	0.45g	ショウマ	0.09g
トウキ	0.45g	トウジン	0.75g

※添加物としてトウモロコシデンプン、ハチミツ、精製セラック、マクロゴール6000、薬用炭を含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
電 話：047-303-3201  
受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋2-10-6

URL：<https://www.iskra.co.jp/>