



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

イ ス ク ラ へ い ぜん か り ゅ う イスクラ平喘顆粒

(漢方製剤)

■特徴

「イスクラ平喘顆粒」は、シソシ、ハンゲ、チンピなど10種類の植物性生薬から抽出したエキスを顆粒としたもので、体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのある方の慢性気管支炎、気管支ぜんそくの改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等
を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。

※裏面もお読みください。

■効能・効果

体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのあるものの次の諸症：慢性気管支炎、気管支ぜんそく

■用法・用量

次の量を、いずれも1日3回、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

■成分・分量

本品1日量3包（4.5g）中、下記成分及び分量の生薬より製した平喘エキス2.4gを含有します。

シソシ	3.0g
ハンゲ	4.0g
チンピ	2.5g
ゼンコ	2.5g
ケイヒ	2.5g
トウキ	2.5g
コウボク	2.5g
タイソウ	1.0g
ショウキョウ	0.5g
カンゾウ	1.0g

※添加物として乳糖、デキストリンを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
（土、日、祝日を除く）

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

URL：http://www.iskra.co.jp/