



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

イ ス ク ラ か い き がん

イスクラ開気丸

第2類医薬品

(生薬製剤)

■特徴

「イスクラ開気丸」は、シャクヤクやセンレンシなど12種類の植物性生薬から抽出したエキスを同種類の生薬末を加え丸剤としたものです。胃腸疾患に伴う様々な症状の改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないでください。
妊婦又は妊娠していると思われる人。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の診断を受けた人。
胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

- 胃腸疾患に伴う次の諸症状:はき気(むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、胸つかえ、腹部膨満感、腹痛、胃痛、食欲不振、消化不良、下痢
- 腹部膨満感を伴い繰り返し又は交互に現れる下痢及び便秘

※裏面もお読みください。

■用法・用量

次の量を、1日3回、食間又は空腹時に服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	8丸	3回
15歳未満	服用しないでください。	

●用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児には服用させないでください。

■成分・分量

本品1日量24丸(4.68g)は、下記、開気丸乾燥エキス1.77g及び生薬末を含有します。

【開気丸乾燥エキス1.77g: 下記成分及び分量の生薬を用いて製した水製エキス末です。】

シャクヤク ……	1.8g	シュクシャ ……	1.0g	ブクリョウ ……	0.2g
コウボク ……	1.5g	モッコウ ……	1.0g	ビャクズク ……	1.5g
チンピ ……	1.2g	ウコン ……	0.2g	ジンコウ ……	0.3g
エンゴサク ……	1.0g	キジツ ……	0.2g	センレンシ ……	0.1g

【生薬末】

シャクヤク末 ……	0.27g	シュクシャ末 ……	0.15g	ブクリョウ末 ……	0.03g
コウボク末 ……	0.225g	モッコウ末 ……	0.15g	ビャクズク末 ……	0.225g
チンピ末 ……	0.18g	ウコン末 ……	0.03g	ジンコウ末 ……	0.045g
エンゴサク末 ……	0.15g	キジツ末 ……	0.03g	センレンシ末 ……	0.015g

※添加物としてバレイショデンプン、寒梅粉、カルメロースカルシウム、タルク、アラビアゴム末、薬用炭を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室

電 話：047-303-3201

受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋2-10-6

URL: <https://www.iskra.co.jp/>