



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

かみしょうよさん

加味逍遙散 エキス顆粒[東洋]分包

ISK616

(漢方製剤)

■特徴

「加味逍遙散エキス顆粒[東洋]分包」は、逍遙散にボタンピとサンシシを加えた顆粒剤で、体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある冷え症、虚弱体质、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症の改善を目的としております。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱い人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症

●効能・効果に関する注意

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

■用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯と一緒に服用してください。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満	服用しないでください。	

●用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児に服用させないでください。

■成分・分量

加味逍遙散エキス顆粒 [東洋] 分包は漢方処方に従って生薬を配合し抽出して得た水製エキスに賦形剤を加えて顆粒剤としたものです。

本品6.0g(3包)中

日局トウキ	3.0g
日局シャクヤク	3.0g
日局ビャクジュツ	3.0g
日局ブクリヨウ	3.0g
日局サイコ	3.0g
日局ボタンピ	2.0g
日局サンシシ	2.0g
日局カンゾウ	2.0g
日局ショウキョウ	1.0g
日局ハッカ	1.0g

上記の混合生薬より抽出した日局加味逍遙散エキス4.35gを含有しています。添加物(賦形剤)として日局トウモロコシデンプンを含有しています。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) この説明書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室

電話：03-3281-3363

受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

発売元 **イスクラ産業株式会社**

東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元 **株式会社東洋薬行**

東京都文京区本郷6-19-7

製造元 **勝昌製薬廠股份有限公司(台湾)**