

## イスクラ冠元顆粒 添付文書改訂のお知らせ

このたび、弊社製品「イスクラ冠元顆粒」の添付文書につきまして、副作用の記載の一部をよりわかりやすい表現とするため、内容を改訂いたしました。

### ■改訂内容

「使用上の注意」に記載の副作用について

「異常出血」→「生理の経血量の増加」に変更いたしました。

本改訂は、これまでの情報を踏まえ、

より具体的でご理解いただきやすい表現とすることを目的として行ったものです。

### ■現在お手元の製品について

引き続き、そのままご使用いただけます。

なお、改訂後の添付文書は、順次製品に反映される予定です。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 【新旧対照表】

下線は変更箇所

改訂前		改訂後	
使用上の注意 ■相談すること 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。		使用上の注意 ■相談すること 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。	
関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢、吐き気、嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感	消化器	下痢、吐き気、嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感
その他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき	その他	<u>生理の経血量の増加</u> (*)、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき